

Specyficzna szczepionka dla bydła (Mastitis)

Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu (informacja na etykiecie).

Droga i sposób podania

Szczepienie krów w laktacji lub ciąży można wykonać dwukrotnie w odstępach 3-4 tygodniowych. U krów w ciąży szczepienie należy wykonać 5 i 2 tygodnie przed porodem. Jeśli to konieczne, szczepienie można powtórzyć po 6 miesiącach. Program szczepień może być kontynuowany w ten sposób w drugim roku.

Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji podskórnej / domięśniowej w okolice szyi lub barku.

W celu sprawdzenia tolerancji na podawaną szczepionkę autogeniczną zaleca się zaszczepienie niewielkiej liczby zwierząt (2-5 sztuk), a następnie obserwację przez minimum 3-5 dni.

Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!

Szczepionka autogeniczna do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

Dawkowanie

Pojedyncza dawka 5,0 ml (patrz etykieta butelki).

Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

Okres karencji

0 dni.

Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 10ml, 100 ml lub 500 ml szczepionki.

Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 4 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

Producent:

RB VAC Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 11c
65-014 Zielona Góra
tel. +48 68 453 70 17
info@rbvac.pl
www.rbvac.pl

Wydane:

Sierpień 2016

Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki autogenicznej podejmuje lekarz weterynarii opiekujący się stadem.

Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk, który może spowodować martwicę. W takich wypadkach istnieje konieczność interwencji chirurgicznej.