

## Specyficzna szczepionka dla bydła

### Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu (informacja na etykiecie).

### Droga i sposób podania

Szczepienie krów i cieląt można wykonać dwukrotnie w odstępie 4 tygodniowym, przy czym pierwsze szczepienie cieląt można wykonać po odsadzeniu. Jeśli to konieczne szczepienie można powtórzyć po 6 miesiącach. Program szczepień może być kontynuowany w ten sposób w drugim roku.

W celu ochrony cieląt w pierwszych tygodniach życia należy zaszczepić krowy w ciąży 5 i 2 tygodnie przed porodem.

Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji podskórnej / domięśniowej w okolicy szyi lub barku.

W celu sprawdzenia tolerancji na podawaną szczepionkę autogeniczną zaleca się zaszczepienie niewielkiej liczby zwierząt (2-5 sztuk), a następnie obserwację przez minimum 3-5 dni.

**Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!**

**Szczepionka autogeniczna do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.**

### Dawkowanie

Pojedyncza dawka u krów wynosi 5,0 ml, u cieląt 3 ml (patrz etykieta szczepionki).

### Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

### Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

### Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

### Okres karencji

0 dni.

### Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 10ml, 100 ml lub 500 ml szczepionki.

### Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 4 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

### Producent:

RB VAC Sp. z o.o.  
ul. Jana z Kolna 11c  
65-014 Zielona Góra  
tel. +48 68 453 70 17  
info@rbvac.pl  
www.rbvac.pl

### Wydane:

Sierpień 2016

**Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii opiekujący się stadem.**

---

### Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk, który może spowodować martwicę. W takich wypadkach istnieje konieczność interwencji chirurgicznej.