

Specyficzna szczepionka dla gołębi

Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu lub olej (informacja na etykiecie).

Droga i sposób podania

W przypadku młodych zwierząt zaleca się pierwsze szczepienie krótko przed odsadzeniem i powtórne szczepienie 2 tygodnie po odsadzeniu.

Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji podskórnej w okolicę szyi zwierząt (nie bezpośrednio za głową).

W celu sprawdzenia tolerancji w stadzie na podawaną szczepionkę zaleca się zaszczepienie niewielkiej liczby ptaków (2-5 zwierząt), a następnie obserwację przez min. 1-2 dni.

Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!

Szczepionka autogeniczna do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

Dawkowanie

Pojedyncza dawka od 0,2 ml do 0,5 ml (patrz etykieta butelki).

Właściwości immunologiczne

Szczepionka indukuje wytwarzanie specyficznych przeciwciał. Prowadzi to do nabycia odporności na patogen użyty do produkcji autoszczepionki.

Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

Skutki uboczne

W niektórych przypadkach w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić miejscowe podrażnienie.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

Okres karencji

0 dni.

Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 10 ml, 50 ml, 100 ml lub 500 ml szczepionki.

Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 2 do 8 °C. Chronić przed światłem, nie zamrażać. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zamrożeniu autoszczepionka nie nadaje się do użycia.

Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

Ostrzeżenie

Szczepionka nie nadaje się do stosowania u ludzi. Zawiera formaldehyd i ewentualnie wodorotlenek glinu. Unikać wdychania, spożycia, kontaktu ze skórą i oczami.

Nie mieszać z innymi szczepionkami, produktami immunologicznymi lub weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Producent:

RB VAC Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 11c
65-014 Zielona Góra
tel. +48 68 453 70 17
info@rbvac.pl
www.rbvac.pl

Wydane:

Wrzesień 2019

Decyzję o zastosowaniu i drodze podania szczepionki autogenicznej podejmuje lekarz weterynarii opiekujący się stadem.

Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk oraz martwica tkanek w okolicy wstrzyknięcia. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.