

Specyficzna szczepionka dla kóz i owiec

Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu (informacja na etykiecie).

Droga i sposób podania

Szczepienie kóz i owiec można wykonać jedno- lub dwukrotnie. Przy szczepieniu obowiązują następujące przerwy między szczepieniami: nie zawierająca *C. perfringens* – 2 tygodnie *C. perfringens* (monowalentna) – 4 tygodnie zawierająca *C. perfringens* skojarzona z innymi czynnikami (poliwalentna) – 3 tygodnie

W celu ochrony młodych kóz i jagniąt w pierwszych tygodniach życia należy dwukrotnie zaszczepić matki przed porodem w odstępach podanych powyżej. Jeśli to konieczne szczepienie można powtórzyć.

Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji podskórnej lub domięśniowej w okolice szyi.

W celu sprawdzenia tolerancji na podawaną szczepionkę autogeniczną zaleca się zaszczepienie niewielkiej liczby zwierząt (2-5 sztuk), a następnie obserwację przez minimum 1-2 dni.

Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!

Szczepionka autogeniczna do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

Dawkowanie

Pojedyncza dawka u kóz lub owiec wynosi 2 lub 3 ml (patrz: etykieta szczepionki).

Oddziaływanie/obszar zastosowania

Szczepienie ciężarnych kóz lub owiec prowadzi do wzrostu koncentracji przeciwciał w siarze. Wraz z siałą osobniki młode nabywają odporności przeciwko patogenom zastosowanym w szczepionce autogenicznej.

Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

Okres karencji

0 dni.

Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 10ml, 100 ml lub 500 ml szczepionki.

Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 2 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zamrożeniu autoszczepionka nie nadaje się do użycia.

Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

Producent:

RB VAC Sp. z o.o.
 ul. Jana z Kolna 11c
 65-014 Zielona Góra
 tel. +48 68 453 70 17
 info@rbvac.pl
 www.rbvac.pl

Wydane:

Wrzesień 2019

Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii opiekujący się stadem.

Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk, który może spowodować martwicę. W takich wypadkach istnieje konieczność interwencji chirurgicznej.