

Specyficzna szczepionka dla królików

Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu.

Droga i sposób podania

Zalecane jest dwukrotne szczepienie w odstępach zależnych od składu szczepionki:

C. perfringens (monowalentna): 4 tygodnie

E. coli lub inny (monowalentna): 2 tygodnie

C. perfringens skojarzona

z *E. coli* (poliwalentna): 4 tygodnie

Po 3 miesiącach szczepienie można powtórzyć

Szczepionka przeciwko *C. perfringens* powinna być stosowana przed pokryciem samic oraz przed wypuszczeniem na wybieg.

Szczepione zwierzęta nie powinny mieć mniej niż 4 tygodnie życia.

Szczepionka podawana jest w postaci iniekcji podskórnej w okolicę klatki piersiowej zwierzęcia.

W celu sprawdzenia tolerancji zwierząt w stadzie na podawaną szczepionkę zaleca się zaszczepienie niewielkiej liczby osobników (5-10 sztuk), a następnie obserwację przez min. 2-3 dni.

Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!

Autoszczepionka do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

Dawkowanie

Zalecana jest następująca dawka:

0,5 ml / zwierzę (do 27 dnia życia lub małe rasy o masie ciała do 1 kg);

1 ml / zwierzę (powyżej 27 dnia życia lub duże rasy o masie ciała powyżej 1 kg)

Patrz: etykieta na butelce.

Właściwości immunologiczne

Szczepionka indukuje wytwarzanie specyficznych przeciwciał. Prowadzi to do nabycia odporności na patogen użyty do produkcji autoszczepionki.

Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne. Nie zaleca się szczepienia zwierząt w ciąży.

Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

Okres karencji

0 dni.

Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 10 ml, 50 ml lub 100 ml szczepionki.

Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 2 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zamrożeniu autoszczepionka nie nadaje się do użycia.

Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

Producent:

RB VAC Sp. z o. o.
ul. Jana z Kolna 11c
65-014 Zielona Góra
tel. +48 68 453 70 17
info@rbvac.pl
www.rbvac.pl

Wydane:

Wrzesień 2019

Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii.

Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk oraz martwica tkanek w okolicy wstrzyknięcia. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.