

Specyficzna szczepionka dla psów i kotów

Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu lub olej (informacja na etykiecie).

Droga i sposób podania

Zalecane jest dwukrotne szczepienie w 2 tygodniowych odstępach. Jeżeli szczepionka zawiera antygeny bakterii *Cl. perfringes* okres pomiędzy szczepieniami powinien być przedłużony do 3 tygodni.

Po 3 miesiącach szczepienie można powtórzyć

Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!

Autoszczepionka do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

Dawkowanie

Pojedyncza dawka od 0,2 do 0,5 ml
0,2 ml / zwierzę o m. c. do 2 kg,
0,3 ml / zwierzę o m. c. do 5 kg,
0,5 ml / zwierzę o m. c. powyżej 5 kg

Droga podania:

Podskórnie w okolicę piersiową boczną.

Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

Okres karencji

0 dni.

Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 100 ml lub 500 ml szczepionki.

Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 2 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Chronić przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zamrożeniu autoszczepionka nie nadaje się do użycia.

Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

Producent:

RB VAC Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 11c
65-014 Zielona Góra
tel. +48 68 453 70 17
info@rbvac.pl
www.rbvac.pl

Wydane:

Wrzesień 2019

Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii.

Interakcje z innymi lekami

Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk oraz martwica tkanek w okolicy wstrzyknięcia. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.